



МИКЦИОНА УРЕТЕРОЦИСТОГРАФИЈА (МУЦГ)


МУЦГ је дијагностичка процедура која користи рендген зрачење и течност која помаже да се прикаже и прегледа функција органа уринарног тракта, тзв. контраст.

Како се изводи ова процедура?

Дете се прима на једнодневну хоспитализацију, на одељење на коме се испитује или лечи (погледајте Пријем у болницу).

Како припремити дете за преглед?

Покушајте да објасните детету, на начин који ће разумети, да је јако важно да сарађује током прегледа (у складу са његовим узрастом).



ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЦЕДУРЕ

- Преглед се изводи ујутру, и траје око 30 минута.
- Ако дете контролише мокрење, треба да се измокси пре снимања.
- Стручно особље ће пласирати уринарни катетер и кроз њега одређену количину контрастног средства.
- Затим се приступа снимању.
- Ако је ваше дете узраста који омогућава сарадњу, лекар ће тражити од њега да по завршетку процедуре испразни бешику.

ВАЖНО!

Потребна негативна уринокултура, не старија од 7 дана.

На дан прегледа пацијент НЕ ЈЕДЕ, али може да узима течност!

Деца узраста до једне године (одојчад) могу да имају последњи оброк најкасније 3 сата пре прегледа.

На преглед је пожељно понети нешто што ће детету скренути пажњу (цуцла, играчка, телефон и слично), као и флашицу с водом.

Нагласите детету да ћете бити с њим све време трајања процедуре. Ако сте трудни, нећете бити у могућности да присуствујете процедури (због X-зрачења), те у том случају поведите другог члана породице да буде с дететом.

Да ли постоје ризици везани за МУЦГ?

Код пацијената с повећаним ризиком од алергијске реакције (историја алергијских реакција) и/или атопијске конституције пацијента, потребна је педијатријска обрада изабраног/ординирајућег лекара, до 7 дана пре прегледа.

Ваше дете ће бити изложено јонизујућем зрачењу (X-зраци) током прегледа, али постављање тачне дијагнозе је важније од изложености дијагностичким дозама зрачења.

После прегледа, у току дана, неопходно је да дете попије адекватну количину воде у односу на узраст (савет за количину течности добићете после прегледа).



После процедуре постоји могућност да се дете жали на неугодност или печење при мокрењу; немојте бринути јер ће наведене тегобе спонтано проћи након дан-два.

У случају појаве крви у урину, бола или повишене телесне температуре, обратите се ОДМАХ свом педијатру.

У заказаном термину јавити се на шалтер Одељења за радиолошку дијагностику.

Понети здравствену књижицу, специјалистички упут и старе налазе.

Све додатне информације можете добити позвом број 021/ 4880 444, лок. 401, или путем електронске поште: radiologija@izzzdiovns.rs